



VIAGRA CONNECT® MAX
syldenafil
VIAGRA CONNECT® MAX
50 mg tabletki powlekane
syldenafil
Na erekcję
4 tabletki powlekane
2 tabletki powlekane

bez recepty

POCZUJ MOC LEGENDY

- O Viagra Connect® Max
- Jak działa Viagra Connect® Max?
- Jak stosować?
- O erekcji

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

VIAGRA CONNECT® MAX
syldenafil

MAKSYMALNA MOC*

dla maksymalnej pewności siebie

VIAGRA CONNECT MAX

Fantastycznie jest cieszyć się sprawnością seksualną i swobodnie z niej korzystać.
Z lekiem Viagra Connect® Max możesz być w szczytowej formie!

Viagra Connect® Max dostępna bez recepty. To zmienia wszystko!
Przekonaj się, jak wraca radość z udanego seksu![1]

VIAGRA CONNECT® MAX
50 mg tabletki powlekane
syldenafil
Na erekcję
4 tabletki powlekane
2 tabletki powlekane

VIAGRA CONNECT® MAX
syldenafil

To moc legendarnej, niebieskiej tabletki.
Od niemal **25 lat** ufa jej cały świat, a w Polsce Viagra Connect® Max dostępna jest **bez recepty!**
Poczuj różnicę z Viagra Connect® Max
i odkryj na nowo radość z seksu.[1]

Jak działa Viagra Connect® Max?

Viagra Connect® Max powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych w penisie, dzięki czemu może do niego dopływać więcej krwi. Oznacza to, że mężczyzna może osiągnąć erekcję, gdy jest podniecony seksualnie. Może też utrzymać erekcję do końca stosunku seksualnego. Po jego zakończeniu erekcja powinna ustąpić.[1]

Aż 74% mężczyzn potwierdziło, że Viagra Connect® Max poprawiła u nich erekcję.[1]

Postaw na szczytową formę!

Im więcej uwagi sobie poświęcicie, tym lepszy efekt będzie mieć Viagra Connect® Max!

Zadbaj o odpowiedni nastrój

Viagra Connect® Max może zacząć działać nawet już po 12 minutach od zastosowania[1] tak, abyś był gotowy w odpowiednim momencie. Pamiętaj, że przyjęcie Viagra Connect® Max nie spowoduje natychmiastowej erekcji – niezbędne jest podniecenie seksualne. Zaangażujcie się w partnerską grę wstępną.

Zrelaksuj się

Nie spiesz się. Viagra Connect® Max działa do czterech godzin po przyjęciu[1]. Lek zadziała w odpowiedzi na stymulację seksualną.

Odzyskaj pewność siebie

Viagra Connect Max to poprawa jakości życia seksualnego, dzięki mocy legendarnej niebieskiej tabletki. Odkryj jak odzyskać pewność siebie i odbudować samoocenę.[1]

Lek może Ci pomóc[1]:
- osiągnąć erekcję w celu odbycia stosunku seksualnego,
- utrzymać erekcję na tyle silną, by odbyć stosunek seksualny,
- utrzymać erekcję przez cały czas trwania stosunku seksualnego.

Nie poddawaj się

Jeżeli produkt Viagra Connect® Max nie zadziała za pierwszym razem, nie przejmuj się tym. Następnym razem, gdy będziesz gotowy, weź kolejną tabletkę - ale nigdy więcej niż jedną na dobę.[1]

Zawsze czytaj zalecenia

W ulotce dla pacjenta dołączonej do opakowania produktu znajdziesz dokładne informacje na temat tego, jak uzyskać najlepsze rezultaty stosując Viagra Connect® Max.

Jak stosować Viagra Connect® Max?

Stosując produkt Viagra Connect® Max zawsze należy postępować według zaleceń w ulotce dla pacjenta dołączonej do opakowania.

1x

Przed stosunkiem seksualnym przyjmij tylko 1 tabletkę.

Tabletkę Viagra Connect® Max zawsze popijaj wodą.

12 min

Lek może zacząć działać nawet już po 12 minutach[1] od zastosowania.

O erekcji

Erekcja, czyli męski wzwód polega na napływie krwi do prącia. Umożliwia to usztywnienie członka, co pozwala na odbycie satysfakcjonującego stosunku seksualnego.

Niektórym mężczyznom trudno jest osiągnąć albo utrzymać erekcję podczas każdego zbliżenia. U niektórych zaś problemy z erekcją pojawiają się raz na jakiś czas.

Problemy ze wzwodem objawiają się w różny sposób. Może to być:

- zupełny brak erekcji[2]
- erekcja niewystarczająca do odbycia stosunku seksualnego[3]
- problem z utrzymaniem erekcji do końca stosunku[3]

Szacuje się, że **około 2,6 miliona mężczyzn** w Polsce [4] doświadcza problemów z erekcją, ale wielu z nich nie chce rozmawiać na ten temat i wypiera problem – czasem nawet latami.[5, 6]

Problemy z erekcją nie powinny być powodem do zakłopotania czy wstydu, a raczej powinny być bodźcem do poszukiwania porady u lekarza w celu weryfikacji stanu zdrowia, w szczególności układu krążenia. Dobra wiadomość jest taka, że na rynku dostępne są skuteczne metody leczenia problemów z zaburzeniami erekcji[5]

VIAGRA CONNECT® MAX
50 mg tabletki powlekane
syldenafil
Na erekcję
4 tabletki powlekane
2 tabletki powlekane

Co jeszcze możesz zrobić?

Ruch to zdrowie[7]

Stres jest silnie powiązany z problemami z erekcją[8], dlatego warto go minimalizować. Osobom zestresowanym może pomóc aktywność fizyczna, ponieważ pomaga się zrelaksować.

Szczuplejszy, czyli zdrowszy i sprawniejszy[9]

Zmiana diety pomoże obniżyć: masę ciała, poziom cholesterolu i ciśnienie krwi. Poprawi też stan Twojego serca.[10] Wspomniane czynniki mają znaczny wpływ na problemy z erekcją.

Unikaj substancji psychoaktywnych[11]

Stosowanie tych substancji negatywnie wpływa na potencję oraz zakłóca zdolność organizmu do osiągnięcia i utrzymana erekcji.[12, 13]

Rzuć palenie[14]

Zaleca się rzucenie palenia jako jedną z najistotniejszych zmian stylu życia, które mogą pomóc w przypadku problemów z erekcją.

***maksymalna dawka dostępna bez recepty**

VIAC-2022-0159

VIAGRA CONNECT® MAX, 50 mg, tabletki powlekane
SKŁAD: Każda tabletka powlekana zawiera cytrynian syldenafilu w ilości równoważnej 50 mg syldenafilu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka o mocy 50 mg zawiera 1,7 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej). **WSKAZANIA DO STOSOWANIA:** Produkt leczniczy VIAGRA CONNECT® MAX jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do satysfakcjonującej aktywności seksualnej. Do skutecznego działania produktu leczniczego VIAGRA CONNECT® MAX konieczna jest stymulacja seksualna. **PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:** Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel, Holandia. Niniejsza informacja została przygotowana dnia 04.09.2024 na podstawie ChPL Viagra Connect® Max, zatwierdzonej dnia 02.05.2024. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Viatris Healthcare Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa, tel. 22 546 64 00.

Referencje:

1. *Viagra Connect® Max - Charakterystyka Produktu Leczniczego (CHPL) zatwierdzona 02.05.2024r.*
2. *EAU_Erectile dysfunction-Patient Information* [https://patients.uroweb.org/other-diseases/erectile-dysfunction/. ,data dostępu 19.05.2020.
3. *Mayo Clinic ED Overview* [https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/erectile-dysfunction/symptoms-causes/syc20355776#:~:text=Flaccid%20and%20erect%20penis,The%20penis%20contains&text=During%20sexual%20arousal%2C%20nerve%20impulses,erection%20firm%20enough%20for%20sex., data dostępu 23.06.2017.
4. Depko A., Krzystanek M., Wełnicki M., Borkowski T., Skrzypulec-Plinta V., Mamcarz A., Skuteczna farmakoterapia zaburzeń erekcji. Czy tadalafil powinien być lekiem dostępnym bez recepty? Opinia ekspercka, 2020; 8
5. Althof SE, Cappelleri JC, Shpilsky A, Stecher V, Diuguid C, Sweeney M, *et al.* Treatment responsiveness of the Self-Esteem And Relationship questionnaire in erectile dysfunction. Urology. 2003;61(5):888-92.
6. Fisher WA, Rosen RC, Eardley I, Niederberger C, Nadel A, Sand M. The multinational men's attitudes to life events and sexuality (males) study: I. prevalence oSf erectile dysfunction and related health concerns in the general population. Current medical research and opinion. 2004;20(5):607-17.
7. *NHS_10 stress busters* [https://www.nhs.uk/mental-health/self-help/guides-tools-and-activities/tips-to-reduce-stress/]., data dostępu 17.05.2020.
8. *CO-OP PHARMACY ERECTILE DYSFUNCTION PR SURVEY* [https://www.atomikresearch.co.uk/case-studies-archive/co-op-pharmacy-erectile-dysfunction-pr-survey/]., data dostępu 27.04.2020.
9. *NHS - Obesity* [https://www.nhs.uk/conditions/obesity/]., data dostępu 14.05.2020.
10. Tostes RC, Carneiro FS, Lee AJ, Giachini FR, Leite R, Osawa Y, *et al.* Cigarette smoking and erectile dysfunction: focus on NO bioavailability and ROS generation. The journal of sexual medicine. 2008;5(6):1284-95.
11. Santtila P, Sandnabba NK, Jern P, Varjonen M, Witting K, Von Der Pahlen B. Recreational use of erectile dysfunction medication may decrease confidence in ability to gain and hold erections in young males. International journal of impotence research. 2007
12. Bang-Ping Jiann, Erectile Dysfunction Associated with Psychoactive Substances, Chonnam Med J 2008
13. Jannini EA, Lenzi A, Isidori A, Fabbri A. COMMENTARY: Subclinical erectile dysfunction: Proposal for a novel taxonomic category in sexual medicine. The Journal of Sexual Medicine. 2006 Sep 1;3(5):787-94
14. *NHS_Erectile dysfunction_impotence* [https://www.nhs.uk/conditions/erection-problems-erectile-dysfunction/]., data dostępu 14.05.2020.