

Lek na żylaki kończyn dolnych



Phlebodia®- informacja o leku

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Phlebodia® 600 mg, tabletki powlekane. **NAZWA POWSZECHNIE STOSOWANA SUBSTANCJI CZYNNEJ:** Diosmina (*Diosminum*). **DAWKA/STĘŻENIE SUBSTANCJI CZYNNEJ:** 1 tabletki zawiera 600 mg diosminy (*Diosminum*). **SUBSTANCJA POMOCNICZA O ZNANYM DZIAŁANIU:** czerwien koszenilowa A, pąs 4R (E 124). **POSTAĆ FARMACEUTYCZNA:** tabletki powlekane. **WSKAZANIA DO STOSOWANIA:** Zmniejszenie objawów niewydolności krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych (żylaki kończyn dolnych), uczucie ciężkości nóg, ból i inne dolegliwości spowodowane zespołem niespokojnych nóg zmuszające do zmiany pozycji ciała. Krótkotrwałe leczenie objawowe żylaków odbytu w okresie zaostrzeń dolegliwości. Produkt **Phlebodia®**, 600 mg, tabletki powlekane wskazany jest dla dorosłych (od 18 lat). **PRZECIWWSKAZANIA:** Leku **Phlebodia®** nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w Charakterystyce Produktu Leczniczego **Phlebodia®**. **PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:** LABORATOIRES INNOTHERA, 22 Avenue Aristide Briand, 94110 Arcueil, Francja. Niniejsza informacja została przygotowana dnia 05.06.2024 r. na podstawie ChPL **Phlebodia®**, zatwierdzonej 11/2022. Dodatkowe informacje dostępne są w Viatris Healthcare Sp. z o.o., ul Postępu 21B, 02-676 Warszawa, tel. 22 546 64 00.



DIO-2024-0005

Sprawdź

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.