



# Duspatalin

## Gastro

*Mebeverini hydrochloridum*

## Sposób na prawidłową pracę jelit!



**Duspatalin® Gastro – informacja o leku.**

**Nazwa produktu leczniczego.** Duspatalin Gastro, 135 mg, tabletki. **Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej.** Mebeveryny chlorowodorek (*Mebeverini hydrochloridum*). **Dawka/stężenie substancji czynnej.** 1 tabletkę Duspatalin Gastro zawiera 135 mg mebeveryny chlorowodoru, 97 mg laktozy, sacharozę. **Postać farmaceutyczna.** Okrągłe, białe tabletki. **Wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania.** Dorośli i dzieci powyżej 10 lat. Objawowe leczenie bólu brzucha lub dyskomfortu w jamie brzusznej (np. wzdęcia, uczucie rozpierania), którym mogą towarzyszyć zaburzenia rytmu wypróżnień i zmiany konsystencji stolca, w tym biegunka i (lub) zaparcie, spowodowanych nieprawidłową pracą przewodu pokarmowego. Nie należy stosować leku Duspatalin Gastro dłużej niż 5 dni bez porady lekarza. Jeśli objawy nie ustąpiły po 5 dniach lub nasiliły się pacjent powinien skonsultować się z lekarzem. **Przeciwwskazania.** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą: laktoza jednowodna, skrobia (kukurydziana lub ziemniaczana), powidon (K25), talk, magnezu stearynian. Otoczka: talk, sacharoza, żelatyna, guma arabska, воск Carnauba. **Podmiot odpowiedzialny.** Viatris Healthcare Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa. Niniejsza informacja została przygotowana dnia 13.03.2024 na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Duspatalin Gastro zatwierdzonej 02/2024. Dodatkowe informacje dostępne są w Viatris Healthcare Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa.

PL-DUSG-2024-00065

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.